



Život bez střeva


Zásady péče o pacienty na domácí parenterální výživě

Co je „život bez střeva“?

Onemocnění doprovázené nedostatečnou funkcí střev nebo syndromem krátkého střeva postihuje všechny věkové skupiny a může vést k dlouhodobé závislosti pacienta na domácí parenterální výživě. Pak se hovoří o chronickém střevním selhání. Často se k němu přidružují i další komplikace nebo onemocnění. Zdravotní stav takových pacientů je tedy nutné posuzovat i řešit komplexně. Život těchto pacientů je zcela závislý na domácí parenterální výživě podávané pomocí centrálního žilního katetru. Zachování funkčnosti katetru a správná péče o něj je pro maximální prodloužení délky jejich života naprosto zásadní.

Centrální žilní katetr

- Je určen **výhradně k podávání domácí parenterální výživy**.
- Je možné zavést do šesti hlavních žil.
- Při správné péči by měl vydržet co nejdéle.
- Je nutné udržovat v **maximálně sterilním prostředí**.
- Kromě zachování vitálních funkcí **by neměl být používán pro žádné další indikace**.



Nesprávné použití katetru nebo **nedostatečná péče** mohou mít za následek **ztrátu vstupu**. Hlavními důvody ztráty jsou nejčastěji:

- infekce
- trombóza
- okluze

Pokud pacient přijde o více než tři žilní vstupy, může být zvažována transplantace střeva, což je výkon, který by měl být maximálně oddálen.

Při příjmu pacienta, pokud není v život ohrožujícím stavu, **vždy kontaktujte Centrum domácí parenterální výživy a zkonzultujte možnost jeho převozu do tohoto Centra nebo další postup. Vaše rozhodnutí může snížit výskyt komplikací a zachránit pacientovi život.**

V případě, že pacient na domácí parenterální výživě potřebuje péči ve vašem zařízení:

PACIENT

Má u sebe **kartičku s kontaktem na své Centrum domácí parenterální výživy** včetně zásadních informací pro ošetřující personál.

Nemůže kontakt sdělit – **na webových stránkách lze dohledat kontakty** na všechna Centra a získat zde potřebné informace.

www.zivotbezstreva.cz
www.skvimp.cz

Když není možný převoz do Centra, je třeba:

- Uzavřít stávající dlouhodobý katetr antimikrobiální zátkou.**
- Za **maximálně sterilních podmínek** zavést nový katetr určený pro výživu a všechny nutné infuze.
- O nový katetr pečovat stejně jako o stávající dlouhodobý katetr.
- Jednou za 7 až 10 dní provést sterilní převaz katetru.

Dlouhodobý katetr je možné použít pro jiné indikace než podání výživy pouze v případě nutnosti zachování vitálních funkcí pacienta, a vždy za přísně sterilních podmínek.

Odborným garantem informací je MUDr. Petr Wohl, PhD., vedoucí programu Centra domácí parenterální výživy IKEM a člen Pracovní skupiny pro domácí parenterální výživu České společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP).